LE BILAN THYROÏDIEN

Version MAI 2014

En concertation avec l'ensemble des endocrinologues de l'établissement, le laboratoire propose une standardisation de la prescription du bilan thyroïdien en fonction du contexte clinique.

Le bon de prescription est simplifié, le prescripteur coche la case « Bilan thyroïdien » et la case correspondant au contexte clinique du patient, les analyses correspondant aux recommandations établies seront déclenchées automatiquement.



L'algorithme des analyses réalisées en fonction du contexte clinique est résumé dans le tableau suivant :

Contexte clinique		Analyses réalisées en 1ère intention	En fonction des 1ers résultats, analyses rajoutées automatiquement par le laboratoire sur le même prélèvement	
			2ème intention	3ème intention
Non précisé		TSH seule	si TSH normale : stop	/
Sans traitement			si TSH ↘ : T4	si T4 normale : T3
Traitement par LT4			si TSH ↗ : T4	/
Traitement par ATS		TSH + T4	/	/
Traitement par amiodarone		TSH seule	si TSH normale : stop	/
			si TSH anormale : T4 + T3	/
Pathologie hypophysaire	suspicion	TSH + T4 + T3	/	/
	suivi	T4 + T3	/	/

Règle de redondance : l'analyse est annulée si l'antériorité est inférieure à 7 jours.

Références :

- *Hypothyroïdies frustres chez l'adulte : diagnostic et prise en charge, recommandation SFE-HAS 2007*
- *Diagnostic et surveillance de l'hyperthyroïdie de l'adulte, ANAES 2000*
- *Diagnostic et surveillance de l'hypothyroïdie de l'adulte, ANAES 1998*